

5g-syndróm – myelodysplastický syndróm s deléciou dlhého ramienka 5. chromozómu. Prítomná býva makrocytárna anémia a trombocytóza.

QCT – skr. angl. *quantitative computerized tomography* kvantitatívna počítačová (výpočtová) tomografia

Quainova tuková degenerácia – [Quain, Richard sir, 1816 – 1898, írsky lekár, kt. opísal steatózu srdca r 1850] tuková degenerácia srdca.

Qlaira[®] tbl film (Bayer, spol. s r. o.) – 2 tmavožlté tbl.: estradiolvalerát 3 mg; 5 jasnočervených tbl.: estradiolvalerátu 2 mg + dienogest 2 mg; 17 svetložltých tbl.: estradiolvalerát 2 mg + dienogest 3 mg; 2 tmavočervené tbl.: estradiolvalerát 1 mg; 2 biele tbl.: neobsahujú liečivá. Kombinovaný antikoncepčný prostriedok; antikoncepcia.

Quadrasa 2 g[®] plv reo (Norgine Pharma) – Natrii aminosalicylas dihydricus 2 g (zodpovedá 1,7 Natrii aminosalicylas) v 1 liekovke. Antireumatikum, antiflogistikum, kt. sa používa v th. distálnej formy ulceróznej kolitídy, kt. neprekračuje ľavý ohyb kolónu a má mierny priebeh.

Quamatel 20 a 40 mg[®] tbl film (Richter Gedeon RT) – Famotidinum 20 al. 40 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Antiulcerózoum, blokátor H₂ receptorov. Používa sa v th. dvanástnikového a benígneho žalúdočného vredu, gastroezofágového refluxu, hypersekrečných stavov (Zollingerov-Ellisonov sy.), prevencia relapsu ulcerácii, prevencia aspirácie žalúdočnej šťavy pri anestézii; →*famotidín*.

Quamatel[®] sol inj (Richter Gedeon RT) – Famotidinum 20 al. 40 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Antiulcerózoum, blokátor H₂ receptorov. Používa sa v th. dvanástnikového a benígneho žalúdočného vredu, gastroezofágového refluxu, hypersekrečných stavov (Zollingerov-Ellisonov sy.), prevencia relapsu ulcerácii, prevencia aspirácie žalúdočnej šťavy pri anestézii; →*famotidín*.

Quarelin[®] tbl (Chinoïn Pharmaceutical & Chemical Worsk) – Metamizolum natrium 400 mg + Coffeinum anhydricum 60 mg + Drotaverini hydrochloridum 40 mg v 1 tbl. Kombinované analgetikum; →*metamizol*.

quasin – kvasín, triterpenoid (molekulový komplex dvoch izomérov), horká látka získavaná z krov čeľade *Simaroubaceae*, predtým používaná ako tonikum; →*Quassia*.

Quassia – rod krov alebo stromov z čeľade *Simaroubaceae*; z jadrového dreva týchto rastlín sa pripravovalo horké tonikum, ktoré sa používalo proti detským mrliam ako insekticídum, príp. náhrada chmeľa pri varení piva (Graman *Quassi* – čierny oslobodený otrok zo Surinamu, ktorý začiatkom 18. storočia objavil liečivé účinky kôry a dreva niektorých miestnych stromov).

quebrachin →*yohimbín*.

quebracho – kebračo, špan. Názov dvoch vzájomne nepríbuzných druhov juhoamerických stromov, obvykle označuje *Aspidosperma quebracho*, z kôry ktorého sa získava alkaloid quebrachin identický s yohimbínom.

Questax 25 mg[®] tbl film (SVUS Pharma) – Kvetiapínfumarát (zodpovedá 25, 100, 200 al. 300 mg kvetiamínu). Antipsychotikum. Používa sa v th. schizofrénie a manických epizód; →*kvetiamín*.

Questran[®] plv sus (Bristol-Myers Squibb spol. s r. o.) – Colestyraminum 4 g v 1 vrecku. Antihyperlipoproteinemikum a antipruriginózum; →*cholestyramín*.

Quetiapin Merck 100 mg[®] tbl film (Generix UK) – Kvetiapín 100 mg vo forme kvetiapínfumarátu v 1 tbl. obalenej filmom. Antipsychotikum, kt. sa používa v th. schizofrénie a manických epizód; →*kvetiapín*.

Quetiapin Pliva 100, 150, 200 a 300 mg[®] tbl flm (Pliva) – Kvetiapín 100, 150, 200 al. 300 mg vo forme kvetiapínfumarátu v 1 tbl. obalenej filmom. Antipsychotikum, kt. používa sa schizofrénie a manických epizód; →*kvetiapín*.

Quetiapin Sandoz 25, 100, 200 a 300 mg[®] tbl flm (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – Kvetiapín 25, 100, 200 al. 300 mg vo forme kvetiapínfumarátu v 1 tbl. obalenej filmom. Antipsychotikum, kt. sa používa v th. schizofrénie a manických epizód; →*kvetiapín*.

Quetiapin Teva 25, 100, 150, 200 a 300 mg[®] tbl flm (Teva Pharmaceuticals Slovakia s. r. o.) – Kvetiapín 25, 100, 150, 200 al. 300 mg vo forme kvetiapínfumarátu v 1 tbl. obalenej filmom. Antipsychotikum, kt. sa používa v th. schizofrénie a manických epizód; →*kvetiapín*.

Quetiapine Lannacher 25 mg[®] tbl flm (Lannacher Heilmittel) – Kvetiapín 25, 100, 200 al. 300 mg vo forme kvetiapínfumarátu v 1 tbl. obalenej filmom. Antipsychotikum, kt. sa používa v th. schizofrénie a manických epizód; →*kvetiapín*.

Quetiapine Orion 25, 100 a 200 mg[®] tbl flm (Lannacher Heilmittel) – Kvetiapín 25, 100 al. 200 mg vo forme kvetiapínfumarátu v 1 tbl. obalenej filmom. Antipsychotikum, kt. sa používa v th. schizofrénie a manických epizód; →*kvetiapín*.

Quetiapine – ratiopharm 100, 200 a 300 mg[®] tbl flm (ratiopharm) – Kvetiapín 100, 200 al. 300 mg vo forme kvetiapínfumarátu v 1 tbl. obalenej filmom. Antipsychotikum, kt. sa používa v th. schizofrénie a manických epizód; →*kvetiapín*.

Queyratova erytroplázia – [Queyrat, Louis, 1856 – 1933, franc. venerológ] postihnutie glans penis histologicky podobné Bowenovej dermatóze s možnosťou prechodu do spinaliómu. Pokladá sa za prekancerózu.

Quinapril-Teva 5, 10, 20 a 40 mg[®] tbl flm (Teva Pharmaceuticals CR) – Chinapril 5, 10, 20 al. 40 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Inhibítor ACE, antihypertenzívum; používa sa v th. hypertenzie, kongestívneho zlyhania srdca a ako antianginózum; →*chinapril*.

Quinpress 5, 10 a 20 mg[®] tbl flm (Generics UK) – chinapril 5, 10 a 20 mg v jednej tbl. obalenej filmom, antihypertenzívum; →*chinapril*.

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml[®] sol inj (Glaxo Group) – Sodná soľ fondaparínu 1,5 mg v 1 naplnenej inj. striekačke (0,3 ml). Antitrombotikum, kt. sa používa v prevencii flebotrombóz a tromboembolických príhod u pacientov, kt. podstupujú ortopedické operácie dolných končatín, ako je operácia zlomeniny bedrovej kosti, kolena al. náhrada bedrového kĺbu, ako aj brušné operácie s vysokým rizikom tromboembolických príhod, po imobilizácii pacientov so srdcovou insuficienciou, poruchou respiračného systému al. akút. infekčným alebo zápalovým ochorením; →*fondaparín*.

Quixidar 5 mg/0,4 ml, 7,5 mg/0,6 ml a 10 mg/0,8 ml[®] sol inj (Glaxo Group) – Sodná soľ fondaparínu 5, 7,5 al. 10 mg v 1 naplnenej inj. striekačke (0,4; 0,6 al. 0,8 ml). Antitrombotikum, kt. sa používa v prevencii flebotrombóz a tromboembolických príhod u pacientov, kt. podstupujú ortopedické operácie dolných končatín, ako je operácia zlomeniny bedrovej kosti, kolena al. náhrada bedrového kĺbu, ako aj brušné operácie s vysokým rizikom tromboembolických príhod, po imobilizácii pacientov so srdcovou insuficienciou, poruchou respiračného systému al. akút. infekčným alebo zápalovým ochorením; →*fondaparín*.

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml[®] sol inj (Glaxo Group) – Sodná soľ fondaparínu 2,5 mg v 1 naplnenej inj. striekačke (0,5 ml). Antitrombotikum, kt. sa používa v prevencii flebotrombóz a tromboembolických príhod u pacientov, kt. podstupujú ortopedické operácie dolných končatín, ako je operácia zlomeniny bedrovej kosti, kolena al. náhrada bedrového kĺbu, ako aj brušné operácie s vysokým rizikom tromboembolických príhod, po imobilizácii pacientov so srdcovou insuficienciou, poruchou respiračného systému al. akút. infekčným alebo zápalovým ochorením; →*fondaparín*.

Quprace 5 mg[®] tbl film (Ronbaxy UK Ltd.) – Quinaprilum 5 mg (vo forme chloridu) v 1 tbl. obalenej filmom. Inhibítor ACE; →*chinapril*.